

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 47.22.87 47.13.82

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

Nouveaux numéros de téléphone : 09-06-43 et 09-27-46

BULLETIN N° 120 - 9 Février 1978

Abonnement annuel : 60 F

ARBORICULTURE FRUITIERE

CLOQUE DU PECHER

Les feuilles s'épaississent, se cloquent, s'enroulent, prennent une couleur jaune ou rougeâtre.

A ce stade il est trop tard pour intervenir contre le champignon. La lutte ne peut être que préventive, dès le gonflement des bourgeons stade B (2 à 3 applications avant la fleur) à l'aide de :

MATIERES ACTIVES	SPECIALITES	FIRMES	DOSES MA/HL	REMARQUES
CAPTAFOL	Difosan	PEPRO	120 g	Pulvérisations soignées - arbres bien mouillés.
	Orthodifolatan	SOPRA		
CAPTANE	Phytocape	BAYER	250 g	<u>Variétés peu sensibles</u>
	Captax	PERRO		May flower, Madeline - Pouyet,
	Orthocide	RHODIAGRI		Amsden, Charles Roux, Nectarine,
	Sepicap	SEPPIC		Cavalier, Nectarine, Fuzzless
	Sovilane	SOVILO		Berta ...
CUIVRE	Nombreuses spécialités		500 g en métal	La première application doit situer autant que possible avant la première chute de pluie. (gonflement des bourgeons lors d'une période de temps doux et sec)
FERBAME	Sepifer	SEPPIC	175 g	
THIRAME	Nombreuses spécialités		175 g	
ZIRAME	Pommarsol	BAYER	175 g	
	Micromyl	PROCHIM		
	Prodaram	PROCIDIA		
	Carbazinc	RHODIAGRI		
	Fucla	SCHERING		
	Sepilate	SEPPIC		
	Ziramex	BOURGEOIS		

GRANDE CULTURE

Jaunissement des escourgeons

Il est observé depuis une quinzaine de jours un jaunissement anormal de certains escourgeons. Cette décoloration s'est tout d'abord manifestée sur des cultures en sol de grève calcaire pour s'étendre ensuite à des escourgeons sur sols variés.

Ce jaunissement n'est pas consécutif à une attaque parasitaire, ni à des déchaus-
sements, mais paraît lié à une mauvaise alimentation des plantes, maintenues en végétation
au cours d'une période où elles sont traditionnellement à l'état de repos.

Une atténuation de ce jaunissement est probable lorsqu'interviendra un relèvement notable des températures.

Il est expressément recommandé de ne pas envisager de traitements herbicides, quel que soit le produit utilisé, sur des cultures n'ayant pas retrouvé leur aspect normal.

D'autre part il est peu souhaitable d'envisager une application fertilisante au cours des prochains jours; cet apport pouvant encore sensibiliser davantage les cultures à de fortes gelées.

Altise à tête dorée ou grosse altise du colza d'hiver

L'évolution larvaire des altises se poursuit grâce à des températures anormales pour la saison. Pour les cultures envahies et qui n'auraient pas encore été traitées, nous rappelons qu'une intervention se justifie lorsqu'on remarque en moyenne 2 larves d'altises par pied.

Le Chef de la Circonscription,

J. DELATTRE